

Синица – лесная птичка небольших размеров с яркой окраской. Наиболее часто посещает кормушки на пришкольной территории. В семейство синицевых зоологические классификации включают 14 родов (с 60 видами и множеством разновидностей). В Беларуси наиболее часто встречаются следующие виды: большая синица (большак); лазоревка; буроголовая гаичка.


Большая синица (большак) распространена в Беларуси повсеместно. Для вида *Parus major* характерны черный окрас головки и шеи, белые щеки, оливковый цвет оперения на спине, желтое оперение на животе. Чаще всего большая синица живет на лесных опушках, речных берегах.

По размерам вид сравним с воробьем. У самцов размах крыльев достигает 26 сантиметров, вес варьируется в пределах 14–21 граммов. Самки мельче, их легко узнать по тусклой окраске перьев. Этот вид выделяется из семейства синицевых голосовым репертуаром. Орнитологи насчитали множество (до 40) вариаций звуков. Больше поет самец, способный чередовать ритмику пения, тембр, высоту звуков (до пяти вариантов). Протяженность пения увеличивается в брачный период. Меньше всего самцы поют поздней осенью, в начале зимы.

Синицы не умеют самостоятельно выдалбливать себе дупло в старых деревьях, поэтому предпочитают занимать дупла других птиц, покинутые прежними хозяевами. Когда у пары появляются птенцы, то родителям приходится кормить их примерно 30-40 раз в час.

В среднем синица съедает летом за день 300-400 гусениц. Весной и летом питается личинками, жуками, гусеницами, пауками, кузнечиками, комарами, муравьями, тлей. Зимой в кормушках питается несоленым салом, семечками.

Сравнение максимальной массы тела некоторых синиц в граммах



Некоторые особенности гнездования синиц

Вид синицы	Место обитания	Обустройство гнезда	Количество кладок	Особенности нахождения птенцов в гнезде
Большая синица	Лесные опушки, речные берега, окраины городов и деревень	Дно гнезда выстилают мхом, травой, пухом	2 кладки	16-22 дня, потом ещё неделю полностью зависимы от родителей
Лазоревка	Березняки, дубняки, сады, ивовые заросли у рек	Дно гнезда выстилают мхом, травой, пухом	1-2 кладки в зависимости от благоприятных условий погоды	Появляются практически без пуха, самка 4-6 дней согревает птенцов, а самец приносит корм, 16-22 дня находятся в гнезде
Буроголовая гаичка	Лесные чащи, хвойные леса, заросшие речные берега	Практически не используют мох, дно выстилают корой и размягчённой древесиной после «выщипывания» внутренней части дупла	1 кладка	17-20 дней, потом ещё около 12 дней зависимы от родителей